

Verkleg hjúkrun

María A. Tr.

Æðaleggir



Leggir

- **Bláæðaaðgangur:**
 - Útlægur bláæðaleggur – fjarlægja e. 72 klst.
 - Miðlægur bláæðaleggur – cvk- í lengri tíma
- **Þvagleggir:**
 - Fjöldi sýkla eykst um 5% með hverjum degi sem leggurinn er inni
 - Einnota þvagleggur, inniliggjandi, leggur f. ofan lífbein, þvagstómaleggur.

Leggir


Bláæðaaðgangur

- Útlægur bláæðaleggur – venflo
 - Má vera í 72 tíma
- Miðlægur bláæðaleggur – cvk
 - Í lengri tíma

Þvagleggir

- 5% aukning sýkla með hverjum degi sem leggur er inni
- Einnota leggur, langtíma inniliggjandi, suprapubic leggur /fyrir ofan lífbein, þvagstómaleggur

Venflo- útbláæðanál





Æðanálar/æðaleggir

- Um 30-50% inniliggjandi sjúklinga á sjúkrahúsum hafa í sér útæðanál eða holæðalegg um lengri eða skemmri tíma



Sýkingar v. æðaleggja

- Nýgengi æðabólgu (phlebitis) um 10% v. Inngjafa í æð meðal skurðsj.
- Blóðsýkingar eru algengastar hjá sjúklingum með æðaleggi.
- Sýkingar vegna æðaleggja koma sem einstök tilfelli en ekki í faröldrum

Æðabólga

- **Orsök:**
 - Erting vegna nálar, lyfja eða v. baktería
- **Einkenni:**
 - Cellulitis - húðnetjubólga
 - Purulent thrombophlebitis- segabólga
 - Bacteraemia - blóðsýking

Áhættuþættir

Ófullnægjandi
sótthreinsun
húðar f. stungu

Illkynja
sjúkdómar,
ónæmisbæling,
brunar og fl.

Tegund
nálar/leggjar.

Tímalengd (aukin
hætta ef lengur
en 72 t.)

Nálægð við opin
sár og menguð
svæði

Nál endurnýjuð

Skipta um nál á 72
tíma fresti

Við æðabólgu skal
skipta um nál

Fjarlægja nálar sem
ekki eru nauðsynlegar

Skipta um nál ef sett
hefur verið upp nál í
flýti þar sem ekki hefur
verið sótthreinsað
svæðið fyrst.

Eftirlit og meðferð á stungustað

- Halda stungustað þurrum og hreinum
- Ekki bera sýklalyf á stungustað
- Fylgjast daglega með stungustað
 - Þreifa varlega yfir umbúðum. Ef sjúlingur kvartar um sársauka eða eymsli eða hefur óútskýrða hitahækkun, þarf að taka umbúðir af og rannsaka svæðið nákvæmlega.
- Ef lengur en 72 klst.-skipta daglega á umbúðum
- Sótthreinsa húðina þegar skipt er á umbúðum

Eftirlit og skipti á innrennsslöngum


Áður en samskeyti eru rofin skal sótthreinsa samskeyti og legginn næst með sprittgríslátíð þona

Nota hanska eða amk. vera með nýpvegnar hendur og sprittaðar


Skipta á 72 tíma frestif tær vökvi

Frh. Eftirlit....

Skipta á 24 tíma
fresti-ef
næringargjöf



Skipta strax ef um
blóðgjöf er að ræða



Lyfjagjöf í legginn skal
fara í framlengingu
sem hægt er að
sótthreinsa

