

Hægðasýni og hægðalyf

Verkleg hjúkrun – HJVG1VLo6

María

Kanna blóð í hægðum

- Fræða sjúklinginn um rannsóknina
- Merkja 3 sýnatökublöð og 3 límmiða með hægðir fyrir blóði
- Sj. hefur hægðir í bekken
- Sýni tekið á stærð við baun frá 2 stöðum úr saurnum með sitthvorum spaðanum
- Glugga lokað og merkja m. límmiðum
- Senda í rannsókn

Hægðir fyrir almennar rannsóknir

- Fræða sj.
- Merkja glas m. límmiða og sýnatökublað/beiðni
- Sj. hefur hægðir í bekken.
- Sýni tekið með skeið áfastri á glasi, innan úr hægðum.
- Sent á rannsóknarstofu
- Setja í kæli ef þarf að bíða

Hægðalosandi lyf gefin í endaparm

- Mikrolax
- Fosfatklysma
- Stólpípugjöf

Framkvæmd á innhellingu

- Útskýra framkvæmd
- Bjóða aðstoð
- Nota hanska
- Nota svuntu eftir þörfum
- Tryggja næði

Frh.

- Hafa undirbreiðslu, bleiu, bekken/wcstól nálægt
- Hafa sj. liggjandi á vinstri hlið
- Hita vökvann í líkamshita
- Meta árangur og skrá
- Smyrja rörið eða kreysta vökva upp úr

Frh.

- Stefna rörsins á að vera í átt að nafla
- Hvetja sj. til að anda djúpt
- Stöðva rennsli ef hægðarþörf, eða rennur út úr endarþarmi
- Halda í sér vökvanum í 10-15 mín
- Hafa bjöllu hjá sj. og aðstoða p.n.
- Fjarlægja rör eftir notkun

Stólpípa

